

予防接種の種類と受け方

★予約後、母子健康手帳・予防票を持参の上、保護者が同伴してください。予防接種を受けられる前に予防接種手帳をご参照ください。

予防接種に保護者が同伴できない場合の委任状について

予防接種は、保護者(父・母・代理人)の同伴が原則ですが、保護者がやむを得ない理由により同伴ができない場合は、委任状が必要になります。お子さんの健康状態を普段より熟知する親族等(祖父母等)に委任することができます。委任状様式は、町のホームページよりダウンロードできます。

		対象年齢	望ましい接種期間	接種方法（回数）
ロタウイルス ※ワクチンは2種類あります。 いずれか一方を継続して接種します。		ロタリックス：生後6週～24週	1回目:生後2月～14週6日	2回（27日以上の間隔）
		ロタテック：生後6週～32週	初回接種は、出生14週6日までに 行う必要があります。	3回（27日以上の間隔）
ヒブ ※5種混合を接種した方は 対象外		生後2月～4歳 ・初回接種開始年齢によって接種回数が異なります。	初回接種開始は 生後2月～6月 追加接種は、初回接種終了後 7月～13月までの間隔をおく	初回接種開始時に生後2月～7月 初回…3回(生後12月に至るまでの間に27日（医師が認める場合20日）以上の間隔) 追加…1回(初回接種終了後7月以上の間隔)
				初回接種開始時に生後7月～12月 初回…2回(生後12月に至るまでの間に27日（医師が認める場合20日）以上の間隔) 追加…1回(初回接種終了後7月以上の間隔)
				初回接種開始時に生後12月～59月 1回
				※注意点 生後12月までに初回接種を完了せずに生後12月以降に追加接種を行う場合は、初回接種終了後27日（医師が認める場合20日）以上の間隔をおいて1回
小児用 肺炎球菌 ※ワクチンは2種類あります。 R6.4～15価が接種可能です		生後2月～4歳 ・初回接種開始年齢によって接種回数が異なります。	初回接種開始は 生後2月～6月 追加接種は、初回接種終了後 60日以上の間隔をおいて 生後12月～14月	初回接種開始時に生後2月～7月 初回…3回(生後24月に至るまでの間に27日以上の間隔) ただし、2回目の接種が生後12月を超えた場合、3回目の接種は行わない。 追加…1回(初回接種終了後60日以上おいて、生後12月に至った日以降)
				初回接種開始時に生後7月～12月 初回…2回(生後24月に至るまでの間に27日以上の間隔) 追加…1回(初回接種終了後60日間以上の間隔をおいて、生後12月に至った日以降)
				初回接種開始時に生後12月～24月 2回(60日以上の間隔)
				初回接種開始時に生後24月～59月 1回
B型肝炎		1歳未満	生後2月～8月	初回…2回(4週以上の間隔) 追加…1回(1回目から20週以上の間隔)
BCG		1歳未満	生後5月～7月	1回
いずれか 一 種 類	四種混合 ジフテリア 百日ぜき 破傷風 不活化ポリオ	1期 生後2月～7歳5か月	生後2月～11月	1期初回…3回(3週以上の間隔)
			初回接種終了後12～17月	追加…1回(初回終了後6月以上の間隔)
	五種混合 ジフテリア 百日ぜき 破傷風 不活化ポリオ ヒブ	1期 生後2月～7歳5か月	生後2月～11月	1期初回…3回(3週以上の間隔)
			初回接種終了後12～17月	追加…1回(初回終了後6月以上の間隔)
二種混合		2期 11歳～12歳	11歳	1回
麻しん 風しん（MR）		1期 1歳	1歳過ぎたらなるべく早く	1期…1回
		2期 小学校入学前1年間（年長児）	小学校入学前の1年間	2期…1回
水痘		1歳～2歳	1回目:生後12月～14月	1回
			2回目:1回目接種後 6～12月	1回(1回目接種後3月以上の間隔)
日本脳炎		1期 生後6月～7歳5か月	初回:3歳	2回(1週以上の間隔)
			追加:4歳 (初回終了後おおむね1年の間隔)	1回(初回接種終了後6月以上の間隔)
		2期 9歳～12歳	9歳	1回
			※特例措置: H7.4.2～H19.4.1生まれの人で1期・2期の接種が不足している方については、20歳未満までの間、残りの回数分の接種ができます。	
子宮頸がん 予防ワクチン		小学6年生～高校1年生相当年齢の女子 ※ワクチンの種類、初回接種の年齢によって 接種回数が異なります	中学1年生	6か月間に3回（ワクチンの種類で接種間隔が異なります。） ・サーバリックス（1月以上の間隔をおいて2回接種後、 1回目から5月以上かつ2回目から2年半以上において1回） ・ガーダシル（1月以上の間隔をおいて2回目接種後、 2回目から3月以上において1回） ・シルガード（1回目接種を15歳になるまでに受ける場合） 少なくとも1回目から5月以上の間隔をあけて1回（2回で完了） ・シルガード（1回目接種を15歳以上になってから受ける場合）1月以上の 間隔をおいて2回目接種後、2回目から3月以上において1回（3回で完了）
		積極的勧奨を差し控えた期間に接種を逃した方へキャッチアップ接種を実施 対象：令和6年度は平成9年度から平成19年度生まれの女子で未接種の方 接種できる期間：令和4年4月から令和7年3月まで		

◎ 実施医療機関

- 福岡県内で予防接種の広域化制度に登録している医療機関で受けることができます。
- 町内医療機関

大刀洗診療所	TEL 77-0220
平和クリニック	TEL 77-1307
やなぎ医院	TEL 77-0858

※ 注意事項

感染症にかかった場合、麻しんは**治癒後4週間程度**、
風しん・おたふくかぜ・水ぼうそうは**治癒後2～4週間程度**、
突発性発疹・手足口病・伝染性紅斑は**治癒後1～2週間の間隔**をあけてください。

